



Specjalistyczne nawozy dla upraw rolnych

Activ ProAmin Warzywa



MgO - %5, **Fe** - %1,80, **Mn** - 0,72 %, **Cu** - %0,06



Charakterystyka i zasada działania:

Activ ProAmin Warzywa to w pełni rozpuszczalny nawóz przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania roślin warzywniczych.

Stosowanie **Activ ProAmin Warzywa** intensyfikuje produktywność roślin poprzez istotne przyspieszenie biosyntezy białek oraz powstanie wewnątrzkomórkowego zysku energetycznego. Energia zaoszczędzona w procesie biosyntezy białek aktywuje pozostałe procesy metaboliczne, co przekłada się na ogólną poprawę funkcjonowania roślin.

Stosowanie:

Stosowanie **Activ ProAmin Warzywa** jest wyjątkowo efektywne w okresach krytycznego zapotrzebowania warzyw na energię (kwitnienie, zawiązywanie owoców, intensywny wzrost, dojrzewanie) oraz w okresach stresowych (stres termiczny, świetlny, wodny, uszkodzenie roślin).

Activ ProAmin Warzywa to biostymulacja produktywności roślin, funkcji życiowych roślin oraz intensyfikacja metabolizmu.

Activ ProAmin Warzywa to poprawa wykorzystania mikroskładników pokarmowych.

Activ ProAmin Warzywa to intensyfikacja procesu fotosyntezy.

Activ ProAmin Warzywa to błyskawiczna przyswajalność.

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach warzywniczych: pomidora, papryki, ogórka, kalafiora, brokuła, marchwi, pietruszki, cebuli, fasoli, grochu, sałaty, selera korzeniowego, buraka ćwikłowego oraz kapusty głowiastej, pekińskiej i brukselskiej.

Składniki pokarmowe % [m/m]				
Produkt	MgO	Fe	Mn	Cu
Activ ProAmin Warzywa	5,00	1,8	0,72	0,06

Activ ProAmin Warzywa



Rośliny	Termin oprysku	Dawkowanie [l/ha]	Ilość oprysków
Pomidor, Papryka	1 – Przed kwitnieniem 2 – Owocowanie	2,0-1,0 3,0-2,0	4-2
Ogórek, Dynia	1 – W fazie 8-4 liści właściwych 2 – Wiązanie owoców 3 – Okres wzrostu owoców/owocowanie	2,0-1,0 2,0-1,0 3,0-2,0	6-3
Kapusta pekińska	1 – Rozwój liści 2 – Wiązanie główek 3 – Rozrost główek	2,0-1,0 3,0-1,0 4,0-3,0	4-3
Kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska)	1 – W fazie 12-8 liści 2 – Rozrost główek	2,0-1,0 4,0-2,0	4-2
Kalafior, Brokuł	1 – Początek formowania róży	2,0-1,0	2-1
Marchew, Pietruszka	1 – Początek grubienia korzenia 2 – Intensywne grubienie korzenia	2,0-1,0 4,0-2,0	3-2
Cebula	1 – Początek wiązania cebul	3,0-1,0	1
Kapusta brukselska	1 – Intensywny wzrost wegetatywny 2 – Wiązanie główek	3,0-1,0 4,0-2,0	3-2 1
Burak ćwikłowy	1 – Początek grubienia korzenia	2,0-1,0	1
Seler korzeniowy	1 – Początek grubienia korzenia 2 – Intensywne grubienie korzenia	2,0-1,0 3,0-1,0	2
Fasola, Groch	1 – Kwitnienie i zawiązywanie strąków 2 – Dorastanie strąków	3,0-1,0 3,0-1,0	2
Salata	1 – Początek zawiązywania główek 2 – Wzrastanie główek	2,0-1,0 2,0-1,0	2

Stosowanie:

Nawóz przeznaczony jest do żywienia pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszanie systemów nawadniających. Zalecane stężenie cieczy roboczej: 600-400 ,%1,0-0,25 litrów roztworu na hektar.

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-%23, nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 3/2 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO%23-, nawóz dolistny, **Activ ProAmin Warzywa**, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek **Activ ProAmin Warzywa**.

Rezultaty stosowania Activ ProAmin Warzywa:

- Intensyfikacja procesów fotosyntezy
- Intensyfikacja funkcji życiowych roślin i metabolizmu w okresie jej intensywnego wzrostu
- Ograniczenie użycia pestycydów
- Większe plony



ARKOP Sp. z o.o.
332-32 Bukowno
ul. Kolejowa 34a
tel.: 51 44 649 32 48+
arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę

