



Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością fosforu i potasu oraz dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami

FoliarActiv Potas-Fosfor + 6-20-36 + mikro



Gwarantowany skład N-6%, P₂O₅-20%, K₂O-36%, SO₃-2,26%, B-2,5%, Mo-0,015%, **EDTA**: Cu-0,015, Mn-0,06%, Zn-0,016%, **DTPA**: Fe-0,12%



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania

FoliarActiv Potas-Fosfor + 6-20-36 + mikro to unikalna kompozycja z dużą dawką potasu i fosforu. Idealnie sprawdza się w dokarmianiu pozakorzeniowym wczesną wiosną oraz w późniejszych etapach wzrostu. FoliarActiv Potas-Fosfor + dostarcza roślinie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych a zwłaszcza potas i fosfor, których pobieranie jest utrudnione podczas złych warunków klimatyczno-glebowych. Potas zawarty w nawozie FoliarActiv Potas-Fosfor + reguluje gospodarkę wodną i ruch aparatów szparkowych roślin, co bezpośrednio wpływa na intensyfikację pobierania składników pokarmowych przez system korzeniowy. Fosfor z kolei intensyfikuje proces fotosyntezy, a przy jednoczesnym podawaniu tych pierwiastków następuje intensywny wzrost i rozwój roślin.

Zalety stosowania FoliarActiv Potas-Fosfor +

- Intensyfikacja procesów energetycznych rośliny
- Lepsze pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy
- Wysoka jakości i większy plon produktów rolnych
- Intensywne kwitnienie
- Zapobieganie niedoborom fosforu i potasu
- Zapewnienie optymalnego wzrostu i rozwoju roślin
- Prawidłowy i intensywny rozwój systemu korzeniowego
- Prawidłowy rozwój nasion i owoców

Objawy niedoboru potasu

- Chloroza brzegów starszych liści przechodząca w nekrozy
- Słabe kwitnienie
- Słabo wykształcony system korzeniowy
- Zamieranie pędów głównych
- Zahamowany wzrost rośliny
- Zwiędły pokrój rośliny

Objawy niedoboru fosforu

- Purpurowe lub fioletowe przebarwienie liści i łodygi
- Silne zahamowanie wzrostu części nadziemnych
- Ograniczenie kwitnienia
- Słabe krzewienie
- Zamieranie pąków bocznych
- Pędy krótkie i cienkie a liście małe i drobne

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

Składniki pokarmowe % [m/m]										
Produkt	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	Zn	Cu	Mn	Fe	B	Mo
					EDTA			DTPA		
FoliarActiv Potas-Fosfor + 6-20-36 + mikro	6	20	36	2,26	0,016	0,015	0,06	0,12	2,5	0,015

FoliarActiv Potas-Fosfor + 6-20-36 + mikro



Zalecenia stosowania

Uprawy		Terminy stosowania nawozu	Dawkowanie [kg/ha]	Ciecz robocza [l/ha]
Zboża	Ozime	I – Krzewienie**	3-5	300-500
		II – Początek strzelanie w źdźbło*		
		III – Koniec fazy kwitnienia*		
	Jare	I – Krzewienie**	3-5	300-500
II – Początkowa faza liścia flagowego*				
III – Koniec fazy kwitnienia*				
Rzepak		I – Ruszenie wegetacji wiosennej**	3-5	300-500
		II – Wydłużenie pędu**		
		III – Faza zielonego pąka**		
Kukurydza		I – Faza 4-5 liści*	3-5	300-500
		II – Faza 6-9 liści*		
		III – Faza rozwoju źdźbła*		
Burak		I – Faza 8-10 liści*	3-5	300-500
		II – Przed zakryciem międzyrzędzi*		
		III – Interwencyjnie po zauważeniu pierwszych objawów chwościka**		
Ziemniak		I – Rozwój liści*	3-5	300-500
		II – Przed zwarciem międzyrzędzi**		
		III – 1-2 zabiegi w terminie od kwitnienia do dojrzewania owoców (jagód)*		
Strączkowe		I – Rozwój pędów bocznych*	3-5	300-500
		II – Rozwój pąków kwiatowych*		
		III – Rozwój strąków*		
Pomidor, papryka		I – Owocowanie 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	2-3	400-600
Kapusta brukselska		I – Wiązanie główek 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	2-6	400-600
Warzywa korzeniowe		I – Intensywne grubienie korzenia*	2-3	400-600
Cebula		I – Intensywne wiązanie cebul*	2-4	400-600
Inne warzywa		I – 3-4 tyg. po wschodach lub przyjęciu się rozsady**	2-4	400-600
		II – Intensywny wzrost**		
		III – 10-14 dni po ostatnim zabiegu**		
Drzewa i krzewy owocowe		I – Przed kwitnieniem**	3-5	700-1000
		II – Po kwitnieniu**		
		III – Wzrost zawiązków**		
Pozostałe rośliny uprawne		2-3 zabiegi co 10-14 dni w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub objawów niedoborów NPK	3-5	300-500

* - zabieg zalecany w programie nawożenia

** - zabieg opcjonalny

Zlecane stężenie cieczy roboczej: uprawy rolnicze: 1%, uprawy warzywnicze: 0,2-1%, uprawy sadownicze: 0,3-0,5%

Stężenie 1% otrzymujemy przez rozpuszczenie 3kg nawozu w 300 l wody lub 5kg nawozu w 500 l wody.

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23% lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napęlić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, FoliarActiv Potas-Fosfor + 6-20-36 + mikro, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek FoliarActiv Potas-Fosfor + 6-20-36 + mikro



ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51

arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę





Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością fosforu i potasu oraz dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami

FoliarActiv Fosfor-Potas + 9-40-26 + mikro



Gwarantowany skład N-9%, P_2O_5 -40%, K_2O -26%, MgO-0,43%, SO_3 -0,87%, B-0,02%, Mo-0,01%, **EDTA**: Cu-0,016, Mn-0,06%, Zn-0,016%, **DTPA**: Fe-0,12%



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania

FoliarActiv Fosfor-Potas + 9-40-26 + mikro to unikalna kompozycja z dużą dawką fosforu i potasu. Idealnie sprawdza się w dokarmianiu pozakorzeniowym wczesną wiosną oraz w późniejszych etapach wzrostu. FoliarActiv Fosfor-Potas + dostarcza roślinie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych a zwłaszcza fosfor i potas, których pobieranie jest utrudnione podczas złych warunków klimatyczno-glebowych. Potas zawarty w nawozie FoliarActiv Fosfor-Potas + reguluje gospodarkę wodną i ruch aparatów szparkowych roślin, co bezpośrednio wpływa na intensyfikację pobierania składników pokarmowych przez system korzeniowy. Fosfor z kolei intensyfikuje proces fotosyntezy, a przy jednoczesnym podawaniu tych pierwiastków następuje intensywny wzrost i rozwój roślin.

Zalety stosowania FoliarActiv Fosfor-Potas +

- Intensyfikacja procesów energetycznych rośliny
- Lepsze pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy
- Wysoka jakości i większy plon produktów rolnych
- Intensywne kwitnienie
- Zapobieganie niedoborom fosforu i potasu
- Zapewnienie optymalnego wzrostu i rozwoju roślin
- Prawidłowy i intensywny rozwój systemu korzeniowego
- Prawidłowy rozwój nasion i owoców

Objawy niedoboru fosforu

- Purpurowe lub fioletowe przebarwienie liści i łodygi
- Silne zahamowanie wzrostu części nadziemnych
- Ograniczenie kwitnienia
- Słabe krzewienie
- Zamieranie pąków bocznych
- Pędy krótkie i cienkie a liście małe i drobne

Objawy niedoboru potasu

- Chloroza brzegów starszych liści przechodząca w nekrozy
- Słabe kwitnienie
- Słabo wykształcony system korzeniowy
- Zamieranie pędów głównych
- Zahamowany wzrost rośliny
- Zwiędły pokrój rośliny

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

Produkt	Składniki pokarmowe % [m/m]										
	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	Zn	Cu	Mn	Fe	B	Mo
						EDTA			DTPA		
FoliarActiv Fosfor-Potas + 9-40-26 + mikro	9	40	26	0,43	0,87	0,016	0,016	0,06	0,12	0,02	0,01

FoliarActiv Fosfor-Potas + 9-40-26 + mikro



Zalecenia stosowania

Uprawy		Terminy stosowania nawozu	Dawkowanie [kg/ha]	Ciecz robocza [l/ha]
Zboża	Ozime	I – Jesienią w fazie widocznych 3-6 liści*	3-5	300-500
		II – Krzewienie**		
		III – Strzelanie w źdźbło**		
	Jare	I – W fazie rozwoju liści*	3-5	300-500
		II – Krzewienie**		
		III – Strzelanie w źdźbło**		
Rzepak		I – Jesienią w fazie 4-8 liści* II – Ruszenie wegetacji wiosennej w fazie formowania pędów bocznych* III – Faza zielonego pąka**	3-5	300-500
Kukurydza		I – Faza 3-5 liści* II – Faza 6-9 liści** III – Faza rozwoju źdźbła**	3-5	300-500
Burak		I – Faza 4-8 liści** II – Przed zakryciem międzyrzędzi**	3-5	300-500
Ziemniak		I – Rozwój liści** II – Przed zwarciem międzyrzędzi** III – Przed kwitnieniem**	3-5	300-500
Strączkowe		I – Rozwój liści* II – Rozwój pąków kwiatowych**	3-5	300-500
Cebula		I – Początek wiązania cebul*	2-4	400-600
Fasola, groch		I – Dorastanie strąków*	2-4	400-600
Inne warzywa		I – 3-4 tyg. po wschodach lub przyjęciu się rozsady** II – Intensywny wzrost** III – 10-14 dni po ostatnim zabiegu**	2-4	400-600
Drzewa i krzewy owocowe		I – Przed kwitnieniem** II – Po kwitnieniu** III – Wzrost zawiązków**	3-5	700-1000
Pozostałe rośliny uprawne		2-3 zabiegi co 10-14 dni w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub objawów niedoborów NPK	3-5	300-500

* - zabieg zalecany w programie nawożenia

** - zabieg opcjonalny

Zlecane stężenie cieczy roboczej: uprawy rolnicze: 1%, uprawy warzywnicze: 0,2-0,75%, uprawy sadownicze: 0,3-0,5%

Stężenie 1% otrzymujemy przez rozpuszczenie 3kg nawozu w 300 l wody lub 5kg nawozu w 500 l wody.

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23% lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napęlić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, FoliarActiv Fosfor+ Plus 9-40-26 + mikro, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek FoliarActiv Fosfor-Potas + 9-40-26 + mikro



ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51

arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę





Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą dawką fosforu oraz wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami

FoliarActiv Fosfor + 10-52-10 + mikro



Gwarantowany skład N-10%, P_2O_5 -52%, K_2O -10%, B-0,02%, Mo-0,01%,
EDTA: Cu-0,015, Mn-0,06%, Zn-0,015%, **DTPA:** Fe-0,12%



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania

FoliarActiv Fosfor + 10-52-10+mikro to idealny nawóz do pozakorzeniowego dokarmiania roślin w ich początkowych etapach wzrostu. Dzięki dużej zawartości fosforu pośrednio stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwłaszcza podczas niskich temperatur, które uniemożliwiają pobieranie tego makroskładnika. Dodatkowo FoliarActiv Fosfor + pozwala optymalnie wykorzystać małą powierzchnię blaszki liściowej młodej rośliny w celach intensywnej fotosyntezy.

Zalety stosowania FoliarActiv Fosfor +

- Intensyfikacja procesów energetycznych rośliny
- Lepsza jakość i większy plon
- Intensywne kwitnienie
- Zapobieganie niedoborom fosforu podczas niskich temperatur
- Zapewnienie optymalnego wzrostu i rozwoju roślin
- Prawidłowy rozwój systemu korzeniowego

Objawy niedoboru fosforu

- Purpurowe lub fioletowe przebarwienie liści i łodygi
- Silne zahamowanie wzrostu części nadziemnych
- Ograniczenie kwitnienia
- Słabe krzewienie
- Zamieranie pąków bocznych
- Pędy krótkie i cienkie a liście małe i drobne

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

Składniki pokarmowe % [m/m]									
Produkt	N	P_2O_5	K_2O	Zn	Cu	Mn	Fe	B	Mo
				EDTA			DTPA		
FoliarActiv Fosfor + 10-52-10+mikro	10	52	10	0,015	0,015	0,06	0,12	0,02	0,01

FoliarActiv Fosfor + 10-52-10 + mikro



Zalecenia stosowania

Uprawy	Terminy stosowania nawozu	Dawkowanie [kg/ha]	Ciecz robocza [l/ha]
Zboża	I – Krzewienie** II – Strzelanie w źdźbło**	3-5	300-500
Rzepak	I – Jesienią w fazie 6-8 liści** II – Ruszenie wegetacji wiosennej**	3-5	300-500
Kukurydza	I – Faza 3-5 liści- II – W okresie chłódów, 2 zabiegi co 10-14 dni**	3-5	300-500
Burak	I – Faza 4-8 liści II – Przed zwraciem międzyrzędzi**	3-5	300-500
Ziemniak	I – Rozwój liści** II – Formowanie pędów** III – Przed kwitnieniem**	3-5	300-500
Warzywa kapustne	I – Po wysadzeniu rozsady 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Warzywa korzeniowe	I – W fazie 2-4 liści 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Pomidor, papryka	I – Po wysadzeniu roślin 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Ogórek, dynia	I – W fazie 2-4 liści właściwych 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Seler korzeniowy	I – Po wysadzeniu rozsady 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Cebula	I – W fazie 2-4 liści 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Fasola, groch	I – Po wschodach 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
	II – Kwitnienie i zawiązywanie strąków*	2-4	
Sałata	I – Po wysadzeniu rozsady*	1-3	400-600
Drzewa i krzewy owocowe	I – Wzrost i dojrzewanie owoców** II – 10-14 dni po ostatnim zabieg**	3-5	700-1000
Pozostałe rośliny uprawne	2-3 zabiegi co 10-14 dni w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub objawów niedoborów NPK	3-5	300-500

* - zabieg zalecany w programie nawożenia

** - zabieg opcjonalny

Zlecane stężenie cieczy roboczej: uprawy rolnicze: 1%, uprawy warzywnicze: 0,2-0,75%, uprawy sadownicze: 0,3-0,5%

Stężenie 1% otrzymujemy przez rozpuszczenie 3kg nawozu w 300 l wody lub 5kg nawozu w 500 l wody.

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23% lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, FoliarActiv Fosfor + 10-52-10+mikro, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek FoliarActiv Fosfor + 10-52-10+mikro.



ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51

arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę





Zrównoważony nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin
wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami

FoliarActiv Balans

20-20-20 + mikro



Gwarantowany skład N-20%, P_2O_5 -20%, K_2O -20%, MgO-0,7%, SO_3 -1,38%,
B-0,02%, Mo-0,01%, EDTA: Cu-0,015, Mn-0,06%,
Zn-0,01%, DTPA: Fe-0,12%



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro to w pełni rozpuszczalny, idealnie zrównoważony nawóz NPK przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Dzięki wysokiej zawartości podstawowych makroskładników (NPK) zapewnia optymalne zaopatrzenie roślin w czasie największego ich zapotrzebowania na te pierwiastki. Ponadto efektywnie przeciwdziała skutkom występowania stresów ograniczających pobieranie składników pokarmowych z gleby, jak również intensyfikuje podstawowe procesy życiowe roślin.

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro dzięki kompletności schelatowanych mikroskładników zaopatruje roślinę kompleksowo, co ma bezpośredni wpływ na wzrost i rozwój roślin a następnie na otrzymany plon.

Stosowanie

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro jest wyjątkowo efektywny w okresach największego zapotrzebowania na makro i mikroskładniki oraz podczas występowania czynników stresowych.

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro to efektywne wzrost i rozwój roślin

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro to szybkie i łatwe dostarczenie roślinom azotu, fosforu i potasu

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro to łatwo przyswajalne mikroskładniki w postaci chelatów

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro to całkowita rozpuszczalność

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

Składniki pokarmowe % [m/m]											
Produkt	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	Zn	Cu	Mn	Fe	B	Mo
						EDTA			DTPA		
FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro	20	20	20	0,7	1,38	0,01	0,015	0,06	0,12	0,02	0,01

FoliarActiv Balans

20-20-20 + mikro



Zalecenia stosowania

Uprawy		Terminy stosowania nawozu	Dawkowanie [kg/ha]	Ciecz robocza [l/ha]
Zboża	Ozime	I – Początkowa faza krzewienia* II – Strzelanie w źdźbło** III – Otwarcie pochwy liścia flagowego*	3-5	300-500
	Jare	I – Krzewienie* II – Strzelanie w źdźbło* III – Przed kłoszeniem*	3-5	300-500
Rzepak		I – Ruszenie vegetacji wiosennej* II – Wydłużenie łodygi** III – Faza zielonego zwartego pąka*	3-5	300-500
Kukurydza		I – Faza 3-5 liści** II – Faza 6-9 liści** III – Przed kwitnieniem*	3-5	300-500
Burak		I – Faza 4-8 liści* II – Przed zakryciem międzyrzędzi**	3-5	300-500
Ziemniak		I – Formowanie pędów* II – Przed zwarciem międzyrzędzi* III – Powstawanie kwiatostanów*	3-5	300-500
Strączkowe		I – Rozwój liści** II – Rozwój pędów bocznych** III – Intensywny wzrost (wydłużenie międzywęźli)*	3-5	300-500
Pomidor, papryka		I – Przed kwitnieniem 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	2-3	400-600
Ogórek, dynia		I – W fazie 4-8 liści właściwych* II – Okres wzrostu owoców/ owocowanie*	2-3	400-600
Marchew, pietruszka		I – W fazie 4-10 liści właściwych*	2-3	400-600
Fasola, groch		I – Intensywny wzrost vegetatywny*	2-3	400-600
Inne warzywa		I – 3-4 tyg. po wschodach, przyjęciu się rozsady** II – intensywny wzrost** III – 10-14 dni po ostatnim zabiegu**	2-4	400-600
Drzewa i krzewy owocowe		I – Przed kwitnieniem** II – Po kwitnieniu** III – Wzrost zawiązków**	3-5	700-1000
Pozostałe rośliny uprawne		2-3 zabiegi, co 10-14 dni w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub objawów niedoborów NPK	3-5	300-500

* - zabieg zalecany w programie nawożenia

** - zabieg opcjonalny

Zlecane stężenie cieczy roboczej: uprawy rolnicze: 1%, uprawy warzywnicze: 0,2-0,75%, uprawy sadownicze: 0,3-0,5%. Stężenie 1% otrzymujemy przez rozpuszczenie 3kg nawozu w 300 l wody lub 5kg nawozu w 500 l wody.

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23% lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro.



ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51

arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę





Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością azotu i dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami

FoliarActiv Azot + 33-10-10 + mikro



Gwarantowany skład N-33%, P_2O_5 -10%, K_2O -10%, B-0,02%, Mo-0,015%,
EDTA: Cu-0,015, Mn-0,06%, Zn-0,016%, **DTPA:** Fe-0,12%



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania

FoliarActiv Azot + 33-10-10 + mikro to w pełni rozpuszczalny, unikalnie zbilansowany nawóz NPK o podwyższonej zawartości azotu. Idealnie sprawdza się w dokarmianiu pozakorzeniowym podczas intensywnego wzrostu i rozwoju rośliny jak również w sytuacjach niedostatecznego zaopatrzenia rośliny w ten pierwiastek przez system korzeniowy. Azot odgrywający kluczową rolę w większości procesów zachodzących w roślinie i jest najbardziej plonotwórczym pierwiastkiem wśród makroskładników i mikroskładników. Dlatego też stosowanie FoliarActiv Azot + zapewnia uzyskanie zdrowych i wysokich plonów.

Zalety stosowania FoliarActiv Azot +

- Intensywny wzrost i rozwój części nadziemnych i podziemnych
- Zapobieganie niedoborom azotu
- Intensyfikacja fotosyntezy
- Wysokie plony
- Obfite kwitnienie
- Zwiększenie zawartości białka w roślinie
- Lepsza zdrowotność roślin

Objawy niedoboru azotu

- Silne zahamowanie wzrostu
- Słabe krzewienie
- Ograniczone kwitnienie
- Skracanie fazy wegetatywnej
- Wcześniejsze dojrzewanie
- Zamieranie pąków bocznych
- Chloroza i zasychanie liści starszych
- Wątle rośliny o cienkich pędach i małych liściach

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

Składniki pokarmowe % [m/m]									
Produkt	N	P_2O_5	K_2O	Zn	Cu	Mn	Fe	B	Mo
				EDTA			DTPA		
FoliarActiv Azot + 33-10-10 + mikro	33	10	10	0,016	0,015	0,06	0,12	0,02	0,015

FoliarActiv Azot + 33-10-10 + mikro



Zalecenia stosowania

Uprawy	Terminy stosowania nawozu	Dawkowanie [kg/ha]	Ciecz robocza l/ha
Zboża	I – Krzewienie** II – Strzelanie w źdźbło** III – Początek kłoszenia**	3-5	300-500
Rzepak	I – Faza intensywnego wzrostu, wydłużenie łodygi* II – Faza zielonego zwartego pąka** III – Rozwój łuszczyń*	3-5	300-500
Kukurydza	I – Faza 4-6 liści** II – Faza 8-10 liści** III – Faza rozwoju źdźbła**	3-5	300-500
Burak	I – Faza 5-10 liści** II – 10-14 dni po ostatnim zabiegu** III – Przed zakryciem międzyrzędzi**	3-5	300-500
Ziemniak	I – Formowanie pędów** II – Intensywny wzrost pędów (zwarcie międzyrzędzi)** III – Przed kwitnieniem**	3-5	300-500
Pomidor, papryka	I – Okres wzrostu owoców 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	2-3	400-600
Kapusta pekińska	I – Rozrost główek 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	2-3	400-600
Kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska)	I – Wiązanie główek 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	2-3	400-600
Kalafior, brokuł	I – Wzrost i rozwój róży 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	2-3	400-600
Marchew, pietruszka	I – Początek grubienia korzenia*	2-3	400-600
Cebula	I – Intensywny wzrost wegetatywny*	2-3	400-600
Inne warzywa	I – 3-4 tyg. po wschodach lub przyjęciu się rozsady** II – intensywny wzrost** III – 10-14 dni po ostatnim zabiegu**	2-4	400-600
Drzewa i krzewy owocowe	I – Przed kwitnieniem** II – Po kwitnieniu** III – Intensywny wzrost zawiązków**	3-5	700-1000
Pozostałe rośliny uprawne	2-3 zabiegi co 10-14 dni w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub objawów niedoborów NPK	3-5	300-500

* - zabieg zalecany w programie nawożenia

** - zabieg opcjonalny

Zlecane stężenie cieczy roboczej: uprawy rolnicze: 1%, uprawy warzywnicze: 0,2-0,75%, uprawy sadownicze: 0,3-0,5%

Stężenie 1% otrzymujemy przez rozpuszczenie 3kg nawozu w 300 l wody lub 5kg nawozu w 500 l wody.

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23% lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, FoliarActiv Azot + 33-10-10 + mikro, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek FoliarActiv Azot + 33-10-10 + mikro.



ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51

arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę





Zrównoważony nawóz NPK wzbogacony schelatowanymi mikrośkładnikami z zwiększoną zawartością boru

FoliarActiv Balans

20-20-20+mikro z borem



Gwarantowany skład N-20%, P_2O_5 -20%, K_2O -20%, MgO-0,35%, SO_3 -0,63%, B-0,1%, Mo-0,01%, **EDTA**: Cu-0,03, Mn-0,01%, Zn-0,02%, **DTPA**: Fe-0,02%



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem to w pełni rozpuszczalny, idealnie zrównoważony nawóz NPK przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Dzięki wysokiej zawartości podstawowych makroskładników (NPK) zapewnia optymalne zaopatrzenie roślin w czasie największego ich zapotrzebowania na te pierwiastki. Ponadto efektywnie przeciwdziała skutkom występowania stresów ograniczających pobieranie składników pokarmowych z gleby, jak również intensyfikuje podstawowe procesy życiowe roślin. Z kolei dodatkowa dawka boru zapewnia roślinom optymalizację podziałów komórkowych i rozwój narządów generatywnych.

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem dzięki kompletnemu schelatowanym mikrośkładnikom zaopatruje roślinę kompleksowo, co ma bezpośredni wpływ na wzrost i rozwój roślin, a następnie na otrzymany plon.

Stosowanie

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem jest wyjątkowo efektywny w okresach największego zapotrzebowania na makro i mikrośkładniki oraz podczas występowania czynników stresowych.

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem to efektywne wzrost i rozwój roślin

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem to szybkie i łatwe dostarczenie roślinom azotu, fosforu i potasu

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem to łatwo przyswajalne mikrośkładnik w postaci chelatów

FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem to całkowita rozpuszczalność

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

Składniki pokarmowe % [m/m]											
Produkt	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	Zn	Cu	Mn	Fe	B	Mo
						EDTA			DTPA		
FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem	20	20	20	0,35	0,63	0,02	0,03	0,01	0,02	0,1	0,01

FoliarActiv Balans

20-20-20+mikro z borem



Zalecenia stosowania

Uprawy	Terminy stosowania nawozu	Dawkowanie [kg/ha]	Ciecz robocza [l/ha]
Zboża	Ozime I – Początkowa faza krzewienia* II – Strzelanie w źdźbło** III – Otwarcie pochwy liścia flagowego*	3-5	300-500
	Jare I – Krzewienie* II – Strzelanie w źdźbło* III – Przed kłoszeniem*	3-5	300-500
Rzepak	I – Ruszenie wegetacji wiosennej* II – Wydłużenie łodygi** III – Faza zielonego zwartego pąka*	3-5	300-500
Kukurydza	I – Faza 3-5 liści** II – Faza 6-9 liści** III – Przed kwitnieniem*	3-5	300-500
Burak	I – Faza 4-8 liści* II – Przed zakryciem międzyrzędzi**	3-5	300-500
Ziemniak	I – Formowanie pędów* II – Przed zwarcie międzyrzędzi* III – Powstawanie kwiatostanów*	3-5	300-500
Strączkowe	I – Rozwój liści** II – Rozwój pędów bocznych** III – Intensywny wzrost (wydłużenie międzywęźli)*	3-5	300-500
Pomidor, Papryka	I – Przed kwitnieniem 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	2-3	400-600
Ogórek, Dynia	I – W fazie 4-8 liści właściwych* II – Okres wzrostu owoców/ owocowanie*	2-3	400-600
Marchew, Pietruszka	I – W fazie 4-10 liści właściwych*	2-3	400-600
Fasola, Groch	I – Intensywny wzrost wegetatywny*	2-3	400-600
Inne warzywa	I – 3-4 tyg. po wschodach, przyjęciu się rozsady** II – intensywny wzrost** III – 10-14 dni po ostatnim zabiegu**	2-4	400-600
Drzewa i krzewy owocowe	I – Przed kwitnieniem** II – Po kwitnieniu** III – Wzrost zawiązków**	3-5	700-1000
Pozostałe rośliny uprawne	2-3 zabiegi, co 10-14 dni w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub objawów niedoborów NPK	3-5	300-500

* - zabieg zalecany w programie nawożenia, ** - zabieg opcjonalny

Zlecane stężenie cieczy roboczej: uprawy rolnicze: 1%, uprawy warzywnicze: 0,2-0,75%, uprawy sadownicze: 0,3-0,5%

Stężenie 1% otrzymujemy przez rozpuszczenie 3kg nawozu w 300 l wody lub 5kg nawozu w 500 l wody.

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23% lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszałkę; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro z borem.



ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51

arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę

