



Faza rozwojowa



Rodzaj nawozu



Program mineralnego żywienia porzeczek czarnej i borówki amerykańskiej nawozami ARKOP Sp. z o.o. chelaty zawiera chelaty Rodzaj nawozu	Faza rozwojowa					
		Początek wegetacji	Pełnia ulistnienia	Kwitnienie	Wzrost i dojrzewanie owoców	Po zbiorach owoców
		Activ Start Sady NPK	2-3 zabiegi profilaktyczne wzmacniające co 10-14 dni w dawce 3 kg/ha. Zabiegi interwencyjne przed i po wystąpieniu czynnika stresowego w dawce 3-5 kg/ha			
		Activ ProAmin Sady	2-4 zabiegi co 10-14 dni w dawce 1-2l/ha			
		Activ ProWigor Sady	4-5 zabiegów co 10-14 dni w dawce 3-5 l/ha			
		Actibor 150 Super Actibor 21	2-3 zabiegi w dawce 0,5-1,0 l/ha 2-3 zabiegi w dawce 0,5-1,0 kg/ha			
		Activ Owoc NPK	1-2 zabiegi co 10-14 dni w dawce 3-5 kg/ha			
		ActiCal	2-3 zabiegi co 10-14 dni w dawce 1,5-1,8 l/ha			
		Bor-Cynk Activ	2-3 zabiegi co 10-14 dni w dawce 3-4 kg/ha			
		Activ Antychloroza	4-5 zabiegów co 10-14 dni w dawce 3-5 kg/ha			
Activ Cynkowo-Manganowy	Faza rozwojowa	Jeden zabieg w dawce 2-3 kg/ha	1-2 zabiegi w dawce 4-5 kg/ha			
		Siarczanu Magnezu Jednowodny	3-4 zabiegi co 10-14 dni w dawce 5-10 kg/ha			
		Actipol EDTA Fe Mn Zn Cu	3-5 zabiegów co 10-14 dni w dawce 1,0-1,5 kg/ha			
		Nabrzmiwanie pąków	Początek kwitnienia	Koniec kwitnienia	Wzrost i dojrzewanie owoców	Po zbiorach owoców
		Activ Start Sady NPK	2-3 zabiegi profilaktyczne wzmacniające co 10-14 dni w dawce 3 kg/ha. Zabiegi interwencyjne przed i po wystąpieniu czynnika stresowego w dawce 3-5 kg/ha			
		Activ ProAmin Sady	2-4 zabiegi co 10-14 dni w dawce 1-3l/ha			
		Activ ProWigor Sady	4-5 zabiegów co 10-14 dni w dawce 3-5 l/ha			
		Actibor 150 Super Actibor 21	2-3 zabiegi w dawce 0,5-1,0 l/ha 2-3 zabiegi w dawce 0,5-1,0 kg/ha			
		Activ Owoc NPK	1-2 zabiegi co 10-14 dni w dawce 3-5 kg/ha			
		ActiCal	2-3 zabiegi co 10-14 dni w dawce 1,5-1,8 l/ha			
Bor-Cynk Activ	Faza rozwojowa	Activ Antychloroza	4-5 zabiegów co 10-14 dni w dawce 3-5 kg/ha			
		Activ Cynkowo-Manganowy	1-2 zabiegi w dawce 4-5 kg/ha			
		Siarczanu Magnezu Jednowodny	3-4 zabiegi co 10-14 dni w dawce 5-10 kg/ha			
		Actipol EDTA Fe Mn Zn Cu	3-5 zabiegów co 10-14 dni w dawce 1,0-1,5 kg/ha			

Ogólne uwagi do programu dokarmiania pozakorzeniowego:

Zabiegi dokarmiania pozakorzeniowego wykonywać unikając pełnego nasłonecznienia w temperaturze poniżej 25°C i przy wysokiej wilgotności powietrza.

Roztwór nawozu nanosić na rośliny w formie drobnokropłowego oprysku do pełnego zwilżenia blaszki liściowej ze szczególnym uwzględnieniem dolnej strony liścia.

Dolną zalecaną dawkę nawozu stosować przy zmniejszonej ilości cieczy roboczej na ha oraz przy łącznym stosowaniu nawozu z innym nawozem lub pestycydem.

W przypadku mieszania nawozu z pestycydami należy upewnić się co do braku przeciwwskazań sporządzania danej mieszanki agrochemikaliów.

W przypadku sporządzania mieszanki złożonej z kilku agrochemikaliów należy przestrzegać maksymalnego stężenia cieczy roboczej bezpiecznego dla roślin w danej fazie rozwojowej.

Zabiegi dokarmiania pozakorzeniowego wykonywać nie częściej niż co 7-10 dni.

Do sporządzania cieczy roboczej najlepiej używać wody miękkiej (np. deszczowej) o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia.

Zalecana ilość cieczy roboczej 700-1000 l/ha.