



FoliarActiv® NPK Fosfor Plus 10-52-10 + mikro



Dolistny nawóz NPK o podwyższonej zawartości fosforu, zawierający schelatowane mikroelementy, do wszystkich upraw.



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania:

FoliarActiv® NPK Fosfor Plus 10-52-10 + mikro to idealny nawóz do pozakorzeniowego dokarmiania roślin w ich początkowych etapach wzrostu. Dzięki dużej zawartości fosforu pośrednio stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwłaszcza podczas niskich temperatur, które uniemożliwiają pobieranie tego makroskładnika.

Dodatkowo **FoliarActiv® NPK Fosfor Plus 10-52-10 + mikro** pozwala optymalnie wykorzystać małą powierzchnię blaszki liściowej młodej rośliny w celach intensywnej fotosyntezy.

Rezultaty stosowania FoliarActiv® NPK Fosfor Plus 10-52-10 + mikro:

- Intensyfikacja procesów energetycznych rośliny.
- Lepsza jakość i większy plon.
- Intensywne kwitnienie.
- Zapobieganie niedoborom fosforu podczas niskich temperatur.
- Zapewnienie optymalnego wzrostu i rozwoju roślin.
- Prawidłowy rozwój systemu korzeniowego.

Objawy niedoboru fosforu:

- Purpurowe lub fioletowe przebarwienie liści i łodygi.
- Silne zahamowanie wzrostu części nadziemnych.
- Ograniczenie kwitnienia.
- Słabe krzewienie.
- Zamieranie pąków bocznych.
- Pędy krótkie i cienkie a liście małe i drobne.

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

Składniki pokarmowe % [m/m]									
Produkt	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	B	Cu EDTA	Fe DTPA	Mn EDTA	Mo	Zn EDTA
FoliarActiv® NPK Fosfor Plus 10-52-10 + mikro	10	52	10	0,02	0,015	0,12	0,06	0,01	0,015

FoliarActiv® NPK Fosfor Plus 10-52-10 + mikro



Dawkowanie:

Uprawy	Termin stosowania nawozu	Dawkowanie [kg/ha]	Ilość cieczy roboczej [l/ha]
Zboża	1 - Krzewienie** 2 - Strzelanie w źdźbło**	3-5	200-300
Rzepak	1 - Jesienią w fazie 6-8 liści** 2 - Ruszenie wegetacji wiosennej**	3-5	200-300
Kukurydza	1 - Faza 3-5 liści** 2 - W okresie chłódów, 2 zabiegi co 10-14 dni**	3-5	200-300
Burak	1 - Faza 4-8 liści** 2 - Przed zwarciem międzyrzędzi**	3-5	200-300
Ziemniak	1 - Rozwój liści** 2 - Formowanie pędów** 3 - Przed kwitnieniem**	3-5	200-300
Warzywa kapustne	1 - Po wysadzeniu rozsady 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Warzywa korzeniowe	1 - W fazie 2-4 liści 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Pomidor, Papryka	1 - Po wysadzeniu roślin 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Ogórek, Dynia	1 - W fazie 2-4 liści właściwych 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Seler korzeniowy	1 - Po wysadzeniu rozsady 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Cebula	1 - W fazie 2-4 liści 1-2 zabiegi co 7-10 dni*	1-3	400-600
Fasola, Groch	1 - Po wschodach 1-2 zabiegi co 7-10 dni* 2 - Kwitnienie i zawiązywanie strąków*	1-3 2-4	400-600
Salata	1 - Po wysadzeniu rozsady*	1-3	400-600
Drzewa i krzewy owocowe	1 - Wzrost i dojrzewanie owoców** 2 - 10-14 dni po ostatnim zabiegu**	3-5	700-1000
Pozostałe rośliny uprawne	2-3 zabiegi co 10-14 dni w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub objawów niedoborów NPK	3-5	200-300

* zabieg zalecany w programie nawożenia

** zabieg opcjonalny

Zalecane stężenie cieczy roboczej: uprawy rolnicze: 1%, uprawy warzywnicze: 0,2-0,75%, uprawy sadownicze: 0,3-0,5%. Stężenie 1% otrzymujemy przez rozpuszczenie 3 kg nawozu w 300 l wody lub 5 kg nawozu w 500 l wody.

Sporządzanie roztworu roboczego:

Przy włączonym mieszadle, w zbiorniku opryskiwacza wypełnionym do połowy wodą, kolejno rozpuszczać **L-FoliarActiv 190** lub **L-FoliarActiv 360**, Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23% (wsypywać powoli), **FoliarActiv® NPK Fosfor Plus 10-52-10 + mikro**, inny nawóz dolistny i pestycyd. Gotowy roztwór należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzenia. Zaleca się dawkować **FoliarActiv® NPK Fosfor Plus 10-52-10 + mikro** zgodnie z informacjami z tabeli. Pozostałe składniki roztworu roboczego należy dawkować zgodnie z zaleceniami ich producentów, w dolnej zalecanej dawce.

NAWÓZ WE



ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51
arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę

