



Fosfo Cynk Activ

Płynny nawóz azotowo-fosforowy z cynkiem



Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Charakterystyka i zasada działania:

Fosfo Cynk Activ zawiera łatwo przyswajalny fosfor oraz cynk, wpływające korzystnie na system korzeniowy, zapewniając lepszy start rośliny oraz szybszą regenerację po zimie.

Fosfo Cynk Activ, przeznaczony jest do upraw polowych, warzywniczych oraz sadowniczych, szczególnie do uprawy kukurydzy w początkowych fazach rozwoju w celu intensyfikacji wzrostu systemu korzeniowego. Ponadto, **Fosfo Cynk Activ** znajduje zastosowanie wszędzie, gdzie istnieje zwiększona potrzeba suplementacji fosforem oraz cynkiem.

Dokarmianie fosforem jest kluczowe w początkowym okresie wzrostu, po okresie zimowym, kiedy pobieranie pierwiastka jest ograniczone ze względu na niską temperaturę gleby. Z kolei cynk, dostarczany roślinie w początkowych fazach rozwoju jest ważnym czynnikiem plonotwórczym.

Fosfo Cynk Activ to

- prawidłowy wzrost systemu korzeniowego,
- szybsza regeneracja po zimie,
- skutecznie uzupełnione niedobory fosforu oraz cynku,
- dobry start na samym początku wegetacji,
- lepsze plonowanie.



Instrukcja stosowania:

Nawóz **Fosfo Cynk Activ** przeznaczony jest do dokarmiania pozakorzeniowego, w formie oprysku lub przez zraszacze systemów nawadniających.

Fosfo Cynk Activ może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego, a także z dodatkiem mocznika, Jednowodnego Siarczanem Magnezu MgO-23% i innymi nawozami dolistnymi.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów, zalecamy stosowanie **Fosfo Cynk Activ** z następującymi nawozami dolistnymi:

Activ ProAmin – specjalistycznym aminokwasowym nawozem dolistnym o wysokiej przyswajalności

Amino ProTytan – specjalistycznym nawozem dolistnym stymulującym rozwój roślin, zawierającym aminokwasy, mikroelementy w postaci chelatów oraz tytan

Fosfo Cynk Activ

Składniki pokarmowe % [m/v]	
Azot (N) całkowity	4,3
Azot (amidowy)	4,3
Fosfor (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w wodzie	44,0
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie	10,2

Sporządzanie roztworu roboczego:

Przy włączonym mieszadle, w zbiorniku opryskiwacza wypełnionym do połowy wodą, kolejno rozpuszczać, L-Foliar Activ 190 lub 360, Siarczan Magnezu Jednowodny, **Fosfo Cynk Activ** oraz inny nawóz dolistny, zgodnie z informacjami z tabeli. Gotowy roztwór należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzenia. Pozostałe składniki roztworu roboczego należy dawkować zgodnie z zaleceniami ich producentów, w dolnej zalecanej dawce.

Dawkowanie:

Uprawy	Termin zabiegu	Dawka [l/ha]	Ilość cieczy roboczej [l/ha]
Kukurydza	1 – Faza 3-5 liścia* 2 – Faza 6-9 liścia* 3 – Faza rozwoju źdźbła* 4 – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**	1-2	200-300
Ziemniak	1 – Formowanie pędów* 2 – Od początek powstawania bulw do powstawania kwiatostanów* 3 – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**		
Burak cukrowy	1 – Faza 5-10 liści* 2 – Przed zwarciem międzyrzędzi* 3 – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**	2-3	400-600
Chmiel	1 – Po wykształceniu pędów bocznych* 2 – Przed kwitnieniem* 3 – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**		
Warzywnicze	1 – Od początku wegetacji do zbioru plonów* 2 – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 dni**		
Drzewa i krzewy owocowe	1 – W całym okresie wegetacji, 2-3 zabiegi* 2 – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**	1-2	700-1000
Inne	1 – 2-3 zabiegi w ciągu okresu wegetacyjnego* 2 – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**		

Fertygacja: Przy objętości wody 15 000 – 20 000 l zalecana dawka Fosfo Cynk Activ to 15-20 l

* zabieg zalecany w programie nawożenia ** zabieg opcjonalny



Aby dowiedzieć się więcej:

Zadzwoń: +48 32 649 44 51

Napisz: arkop@arkop.pl

Wejdź na stronę: www.arkop.pl

ARKOP Sp. z o.o.

32-332 Bukowno

ul. Kolejowa 34a

*Zakład posiada
certyfikat na zgodność
z normą PN-EN ISO 9001*

Wspieramy naturę

