RZEPAK - PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Faza rozwojowa	Jesień. Faza 4-8 liści		Wczesna wiosna. Faza formowania pędów bocznych	Faza intensywnego wzrostu (wydłużenie łodygi)	Faza zielonego zwartego pąka	Kwitnienie	Rozwój łuszczyn	Dojrzewania
Faza wg skali BBCH	14-18		21-29	30-35	50-55	60-69	70-72	80-89
Ilość cieczy roboczej	200-300l/ha		200-300l/ha	200-300l/ha	200-300l/ha		200-300l/ha	
Siarczan Magnezu Jednowodny lub AminoMag	4-6kg/ha		4-6kg/ha	4-6kg/ha			5kg/ha	
Mag Potas Activ	3-5kg/ha				3-5kg/ha			
ActiPlon Rzepak	2-3kg/ha							
AminoPower Rzepak			1kg/ha	1kg/ha	1kg/ha			
Activ ProAmin	2-3l/ha		2-3l/ha	2-3l/ha	2-3l/ha			
AminoStymulanit				1-2l/ha				
AminoSelenit	1-2l/ha							
FosfiActiv PK 51-9	2-3l/ha		2-3l/ha					
FoliarActiv Fosfor Potas Plus 9-40-26+mikro	3-5kg/ha							
Root Activ	1l/ha		1l/ha					
FosfiActiv NPK 16-16-16+mikro	2-3l/ha							
FoliarActiv Balans 20-20-20+mikro			3-5kg/ha		3-5kg/ha			
Actipol EDTA Mn-13	0,8-1 kg/ha							
AminoPower Mn-22			0,2-0,4kg/ha	0,2-0,4kg/ha				
L-Actipol EDTA Mo-6	0,25l/ha			0,25l/ha				
Boron Forte lub Actibor	1-2kg(litr)/ha		1-2kg(litr)/ha	1-2kg(litr)/ha				
L-FoliarActiv 190							10-15l/ha	
Immuno Activ Si	1l/ha		1l/ha					
Siarkomag	2-3l/ha		2-3l/ha	2-3l/ha				
Aqua Soft	0,8-1,2l/1000l		0,8-1,2l/1000l	0,8-1,2l/1000l	0,8-1,2l/1000l			

zimowy okres spoczynku

Nie wykonywać zabiegów dokarmiania pozakorzeniowego

Nie wykonywać zabiegów dokarmiania pozakorzeniowego

W celu mineralizacji resztek pożniwnych zastosować Preparon Słoma w ilości 4-10l/ha
Opryski Immuno Activ Si zgodnie z instrukcją