CZEREŚNIA I WIŚNIA - PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Faza rozwojowa	Pękanie pąków	Zielony pąk	Biały pąk	Początek kwitnienia	Koniec kwitnienia	Rozwój owoców	Dojrzewanie owoców	Po zbiorach owoców
Ilość cieczy roboczej	700-1000 l/ha							
	Activ Start Sady NPK **2-3** ♦ co 10-14 dni w dawce **3 kg/ha** w celu wzmocnienia. Zabiegi interwencyjne przed i po wystąpieniu czynnika stresowego w dawce **3-5 kg/ha**.							
		Activ ProWigor Sady **1** ♦ w dawce **2-3 l/ha**			Activ ProWigor Sady **2-3** ♦ co 10-14 dni w dawce **1-1,5 l/ha**			Activ ProWigor Sady **2-3** ♦ w dawce **1-3 l/ha**
			Activ ProAmin **3-4** ♦ co 10-14 dni w dawce **2-3 l/ha**					
		L-FlorActiv Sady **2** ♦ w dawce **1-2 l/ha***				L-FlorActiv Sady **1** ♦ w dawce **1-2 l/ha***		
			Boron Forte lub ActiBor **2-3** ♦ w dawce **0,5-1 kg(litr)/ha**					
					Activ Owoc NPK **1-2** ♦ co 10-14 dni w dawce **3 kg/ha**			
					ActiCal **3-4** ♦ co 10-14 dni w dawce **1,5-2 l/ha**			
								Bor-Cynk Activ **2-3** ♦ co 10-14 dni **3-4 kg/ha**
						Activ Antychloroza **3-5** ♦ co 10-14 dni w dawce **3-5 kg/ha**		
	Activ Cynkowo Manganowy **1** ♦ w dawce **2-3 kg/ha**							Activ Cynkowo Manganowy **1-2** ♦ w dawce **4-5 kg/ha**
		AminoMag Activ C+ lub Siarczan Magnezu Jednowodny **3-4** ♦ co 10-14 dni w dawce **5-10 kg/ha**						
	Chelaty Fe/Mn/Zn/Cu **3-5** ♦ co 10-14 dni w dawce **0,5-1,0 kg/ha**							
			Fosfi Activ PK 51-9 **1** ♦ **3-4 l/ha***				Fosfi Activ PK 51-9 **1** ♦ **3-4 l/ha***	
		Immuno Activ Si **1** ♦ **0,5-1 l /ha**				Immuno Activ Si **1** ♦ **0,5-1 l /ha**		
	Aqua Soft w dawce **0,8-1,2 l/1000 l** wody do każdego oprysku							Aqua Soft w dawce **1,5-1,8 l/1000 l** wody do każdego oprysku

1) W razie niedoborów magnezu i siarki należy użyć Jednowodny Siarczan Magnezu
2) Opryski ImmunoActiv Si wykonywać samodzielnie
3) Stężenie roztworu musi być zgodne z podanymi dawkami na etykiecie
4) Ilość ♦ oznacza liczbę zalecanych zabiegów

*do fertygacij 2-3l/ha